

# ДЕТРАЛЕКС И ДЕТРАГЕЛЬ. ВМЕСТЕ ПРОТИВ ВАРИКОЗА

## Если у Вас варикоз

Узнайте, что это



[detralex.ru/varicose](https://detralex.ru/varicose)

Узнайте ответы  
на многие вопросы



[detralex.ru/articles](https://detralex.ru/articles)

Вступайте в клуб!



[detralex.ru/detralex-club](https://detralex.ru/detralex-club)



### Следуйте рекомендациям врача и не заменяйте назначенное лечение!

Только Ваш лечащий врач способен правильно оценить особенности Вашего организма и течения заболевания. С учетом этих особенностей врач подбирает для Вас наиболее подходящий лекарственный препарат.



### Почему не стоит заменять назначенный препарат без консультации с Вашим врачом

**ВАЖНО!** Низкая цена и надлежащее качество могут расходиться в направлениях. Низкие затраты на лекарственное средство могут обернуться непредвиденными затратами на лечение нежелательных лекарственных реакций и осложнений, а также затратами на пребывание в стационаре<sup>1</sup>.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

# ДЕТРАЛЕКС КЛУБ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ВАРИКОЗА



Рекомендовано  
Ассоциацией  
Флебологов России



## Детралекс®

- Оригинальный препарат<sup>2</sup>
- Выбор многих пациентов<sup>3</sup>
- Оказывает системное действие<sup>4</sup>
- Способствует уменьшению симптомов варикоза<sup>5</sup>
- Детралекс® 1000 мг № 60 на курс 2 месяца<sup>6,4</sup>

## Детрагель®

- 3 правильно подобранных компонента<sup>6</sup>
- Инновационная система доставки веществ<sup>7</sup>
- Способствует уменьшению тяжести, боли в ногах в 3 раза<sup>8</sup> без следов на одежде и коже<sup>9</sup>
- Детрагель® 40 г — до 40 применений, Детрагель® 80 г — до 80 применений<sup>6,10</sup>

\* Курс лечения Детралекс® при симптомах ХЗВ.

1. Марушкин Д.В., Раевская Л.Г. Лечащий врач. 2009;9.
2. gfrs.gosminzdrav.ru/CIP/PermittionReg.aspx. Запрос: название протокола – Детралекс. Дата запроса: 16.10.2020.
3. Данные исследования «ФК-Русь» по покупкам домашних хозяйств в РФ за период с 1.07.2018 по 30.06.2019.
4. Инструкция по медицинскому применению препарата Детралекс®, ЛП 003635, ЛП 004247.
5. Ospite M., Dominici A. Double blind study of the pharmacodynamic and clinical activities of 5683 SE in venous insufficiency. Advantages of the new micronized form. Int Angiol. 1989;8(Suppl. 4):61.
6. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Детрагель®, ЛП-001044.
7. Cesaroni M.R. et al. Angiology. 2001;52(Suppl. 3):S23–S27.
8. Богачев В.Ю. Современная терапия заболеваний вен нижних конечностей, в фокусе трансдермальные флиторные препараты. РМЖ. Ангиология. 2018;6(Ц):61–65.
9. Исследование GFK. Путь покупки местного средства. 2018.
10. De Sanctis M.T. et al. Angiology. 2001;52(Suppl. 3):S57–S62.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

## Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Детралекс® 1000 мг

**Состав\***. Очищенная микронизированная флавоноидная фракция 500 мг: диосмин 450 мг, флавоноиды в пересчете на гесперидин 50 мг. Очищенная микронизированная флавоноидная фракция 1000 мг: диосмин 900 мг, флавоноиды в пересчете на гесперидин 100 мг. **Показания к применению\***. Терапия симптомов хронических заболеваний вен (устранение и облегчение симптомов). Терапия симптомов венозно-лимфатической недостаточности: боль, судороги нижних конечностей, ощущение тяжести и распирания в ногах, усталость ног. Терапия проявлений венозно-лимфатической недостаточности: отеки нижних конечностей, трофические изменения кожи и подкожной клетчатки, венозные трофические язвы. Симптоматическая терапия острого и хронического геморроя. **Способ применения и дозы\***. Венозно-лимфатическая недостаточность – 1000 мг в сутки. Острый геморрой – до 3000 мг в сутки. Хронический геморрой – 1000 мг в сутки. **Противопоказания\***. Повышенная чувствительность к активным компонентам или к вспомогательным веществам, входящим в состав препарата. Беременность и период грудного вскармливания (опыт применения ограничен или отсутствует). Детский возраст до 18 лет (опыт применения отсутствует). Дополнительно для Детралекс® суспензия 1000 мг: непереносимость фруктозы. **Особые указания\***. Назначение препарата не заменяет специфического лечения заболеваний прямой кишки и анального канала. Если симптомы геморроя сохраняются после рекомендуемого курса лечения, следует пройти осмотр у проктолога, который подберет дальнейшую терапию. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами\***. **Беременность/период грудного вскармливания\***. Предпочтительно не применять препарат. **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами\***. **Побочное действие\***. *Часто*: диарея, диспепсия, тошнота, рвота. *Нечасто*: колит. *Редко*: головкружение, головная боль, общее недомогание, кожная сыпь, кожный зуд, крапивница. *Неуточненной частоты*: боль в животе, изолированный отек лица, губ, век. В исключительных случаях – ангионевротический отек. **Передозировка\***. **Фармакологические свойства\***. Детралекс® обладает венозотонирующим и ангиопротективным свойствами. Препарат уменьшает растяжимость вен и венозный застой, снижает проницаемость капилляров и повышает их резистентность. **Форма выпуска\***. **Номер регистрационного удостоверения**: ЛП-003635, ЛП-004247, П N011469/01.

\* Для получения полной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата или получите консультацию специалиста.

## Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Детрагель®

**Состав\***. Гепарин натрия 100,0 МЕ, эссенциальные фосфолипиды 10,0 мг, эсцин 10,0 мг. **Показания к применению\***. Терапия симптомов хронических заболеваний вен. Варикозная болезнь с симптоматикой в виде боли, отеков, ощущения тяжести и усталости в ногах, ночных судорог икроножных мышц и с признаками в виде телеангиэктазий (сосудистые звездочки и сеточки) и варикозных вен. Поверхностный флебит, тромбоз флебит. Гематомы при травмах, включая спортивные растяжения и ушибы. Послеоперационные гематомы без нарушения целостности кожных покровов. **Способ применения и дозы\***. Наружно. Гель наносит тонким слоем на проблемный участок кожи и равномерно распределяет легкими массирующими движениями: 2–3 раза в сутки ежедневно до исчезновения симптомов. Продолжительность лечения – не более 15 дней. Возможность проведения более длительного курса лечения определяется врачом. **Противопоказания\***. Гиперчувствительность к компонентам препарата, геморрагический диатез (в т.ч. тромбцитопеническая пурпура), гемофилия, нарушение целостности кожных покровов в месте нанесения препарата (открытые раны, язвенно-некротические поражения), ожоги, экзема, кожные инфекции. Противопоказан к применению на слизистых. Возраст до 18 лет. **Особые указания\***. Нанесение геля на слизистые оболочки противопоказано. Избегать попадания в глаза. При развитии аллергических реакций немедленно прекратить применение препарата и обратиться к врачу. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами\***. Нельзя наносить на кожу одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения. **Беременность\* и период кормления грудью\***. До настоящего времени не было сообщений о нежелательных эффектах в отношении матери и плода при применении препарата беременными женщинами. Применение во время беременности и в период лактации возможно только в тех случаях, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода, поэтому перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом. **Влияние на способность управлять автомобилем и выполнять работы, требующие высокой скорости психических и физических реакций\***. Исследования по изучению влияния препарата на способность водить автомобиль и управлять механизмами не проводилось. **Побочное действие\***. *Очень редко*: контактный дерматит, крапивница, кожная сыпь, кожный зуд, бронхоспазм. При местном применении эсцина сообщалось о единичных случаях развития острых анафилактических реакций. **Передозировка\***. **Фармакологические свойства\***. Комбинированный препарат, оказывает местное антикоагулянтное, противовоспалительное, венозотонирующее и антиагрегантное действие, снижает проницаемость вен, улучшает микроциркуляцию. **Форма выпуска\***. Гель для наружного применения. **Номер регистрационного удостоверения**: ЛП-001044.

\* Для получения полной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.

Материал предназначен для специалистов.

АО «Сервье»: 125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 7, этаж 7/8/9. Телефон: +7 (495) 937-0700, факс: +7 (495) 937-0701



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ